

Recomendaciones generales de oxigenoterapia a domicilio



No se puede fumar durante la administración del oxígeno en la habitación donde está el aparato, ya que el oxígeno es inflamable.



El aparato de oxígeno debe estar alejado de fuentes de calor como la cocina, los radiadores o aparatos eléctricos.



Ventila la habitación donde haya el aparato con tal de renovar el oxígeno.



Si utilizas cánulas, lubrica la nariz con crema de cacao para evitar heridas. No utilices cremas hidratantes o vaselina.



Limpia la cánula o mascarilla cada día con agua y jabón, y los alargadores, una vez por semana. Se recomienda cambiar la cánula o mascarilla cada 15 días.



Mantén las bombonas de oxígeno en vertical, vigila que no se tumben.



No muevas el aparato por el domicilio, para moverte, utiliza alargadores de una sola pieza de una longitud máxima de 15 m.



El concentrador fijo debe estar en posición vertical y a 15 cm de la pared para facilitar la circulación del aire.



El concentrador portátil debe estar conectado a la red eléctrica para asegurar la carga total de la batería.



No alteres la dosis de oxígeno, el profesional de la salud es quién debe determinar la dosis de oxígeno.



Sigue las instrucciones de mantenimiento del aparato indicadas por la empresa suministradora. En caso de avería, contacta con ellos.