

Vacunas que podrían ser indicadas para adultos según indicaciones médicas y de otra índole

Indicaciones Vacunas	Afecciones del sistema inmunitario (a excepción del VIH)	Diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, alcoholismo crónico	Asplenia (incluidas la esplenectomía electiva y las deficiencias del complemento)	Enfermedad hepática crónica	Insuficiencia renal, enfermedad renal en etapa terminal, personas en hemodiálisis	Personal sanitario	Embarazo	Infección por VIH CD4*T Recuento de linfocitos < 200 células	Infección por VIH CD4*T Recuento de linfocitos > 200 células
Tétanos Difteria Tos ferina (Td/Tdap)	*1 dosis Td de refuerzo cada 10 años	*1 dosis Td de refuerzo cada 10 años	*1 dosis Td de refuerzo cada 10 años	*1 dosis Td de refuerzo cada 10 años	*1 dosis Td de refuerzo cada 10 años	*1 dosis Td de refuerzo cada 10 años	*1 dosis Td	*1 dosis Td de refuerzo cada 10 años	*1 dosis Td de refuerzo cada 10 años
Virus del papiloma humano (HPV)	*3 dosis a mujeres de hasta 26 años	*3 dosis a mujeres de hasta 26 años	*3 dosis a mujeres de hasta 26 años	*3 dosis a mujeres de hasta 26 años	*3 dosis a mujeres de hasta 26 años	*3 dosis a mujeres de hasta 26 años	No recomendada	*3 dosis a mujeres de hasta 26 años	*3 dosis a mujeres de hasta 26 años
Sarampión Rubéola Parotiditis (MMR)	Contraindicada	*1 o 2 dosis	*1 o 2 dosis	*1 o 2 dosis	*1 o 2 dosis	*1 o 2 dosis	Contraindicada	Contraindicada	*1 o 2 dosis
Varicela	Contraindicada	*2 dosis	*2 dosis	*2 dosis	*2 dosis	*2 dosis	Contraindicada	Contraindicada	*2 dosis
Gripe	*1 dosis TIV anual	*1 dosis TIV anual	*1 dosis TIV anual	*1 dosis TIV anual	*1 dosis TIV anual	*1 dosis TIV O LAIV anual	*1 dosis TIV anual	*1 dosis TIV anual	*1 dosis TIV anual
Antineumocócica	*1 o 2 dosis	*1 o 2 dosis	*1 o 2 dosis	*1 o 2 dosis	*1 o 2 dosis	** Recomendada	** Recomendada	*1 o 2 dosis	*1 o 2 dosis

Indicaciones Vacunas	Afecciones del sistema inmunitario (a excepción del VIH)	Diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, alcoholismo crónico	Asplenia (incluidas la esplenectomía electiva y las deficiencias del complemento)	Enfermedad hepática crónica	Insuficiencia renal, enfermedad renal en etapa terminal, personas en hemodiálisis	Personal sanitario	Embarazo	Infección por VIH CD4*T Recuento de linfocitos < 200 células	Infección por VIH CD4*T Recuento de linfocitos > 200 células
Hepatitis A	**Recomendada	**Recomendada	**Recomendada	*2 dosis	**Recomendada	**Recomendada	** Recomendada 2 dosis	** Recomendada 2 dosis	**Recomendada 2 dosis
Hepatitis B	**Recomendada	**Recomendada 3 dosis	**Recomendada 3 dosis	*3 dosis	*3 dosis	*3 dosis	** Recomendada	*3 dosis	*3 dosis
Antimeningocócica	**Recomendada	**Recomendada	*1 o más dosis	**Recomendada	**Recomendada	**Recomendada	** Recomendada 1 o más dosis	** Recomendada 1 o más dosis	**Recomendada 1 o más dosis
Zóster	Contraindicada	*1 dosis	*1 dosis	*1 dosis	**1 dosis	1 dosis	Contraindicada	Contraindicada	No recomendada

Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Estados Unidos 2010

* Para todas las personas de esta categoría que se encuentren en el grupo de edades indicado y que no tengan prueba de inmunidad (p.ej, no tienen documento de vacunación ni prueba de haber contraído la infección en el pasado).

** Recomendada si existe algún otro factor de riesgo (p. ej., indicaciones médicas, ocupacionales, de estilo de vida y otras).